

Ouder dan 1 jaar

Bij temperatuur hoger dan 38,5° C en/of lastig zijn of bij pijn: U mag Paracetamol geven in de vorm van siroop: optrekken volgens gewicht, maximum vier maal per dag, dus om de 6 uur.

Als de koorts onvoldoende daalt bij het gebruik van Paracetamol: U kunt Ibuprofen toedienen: optrekken volgens gewicht, maximum drie keer per dag, dus om de acht uur.

NOOIT IBUPROFEN GEVEN BIJ WINDPOKKEN!

Wanneer de koorts langer dan drie dagen aanhoudt, onvoldoende zakt of als uw kind algemeen ziek is (blijvend braken, kortademigheid,...): maak een afspraak bij uw arts.

Een groot deel van deze controles kunnen ook bij uw huisarts gebeuren. Hij/zij kan steeds overleggen met uw kinderarts of uw kind doorverwijzen indien nodig.

Kinderdagziekenhuis
L. De Meesterstraat 5 - 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 760 77 28



Verantwoordelijke uitgever:

Moerlandstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas | +32 (0)3 760 60 60
www.vitaz.be | info@vitaz.be
BE 0881.291.322 | RPR Gent


art. 15591 | v3 | 15.02.2022



VITAZ
STERK IN ZORG

Informatiefolder

Aanpak van koorts bij kinderen



Beste ouders

Met deze folder willen we u wegwijs maken in de medicatie die u uw kind mag geven in geval van pijn of koorts.

Het type medicatie en de dosis die mag toegediend worden is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Volg de richtlijnen die overeenstemmen met de leeftijd van uw kind.

Koorts

Koorts moet bij kleine kinderen best rectaal gemeten worden. Een afkoelend badje wordt afgeraden om de koorts te laten dalen.

Als uw kind ziek is, is het steeds belangrijk om te kijken naar zijn/haar algemene toestand. Indien uw kind nog voldoende drinkt, de koorts daalt na de toediening van koortswerende medicatie en indien uw kind tussen de koortspieken door nog lacht en speelt, kunt u meestal even afwachten.

Is dit niet het geval, of de koorts gaat systematisch boven de 40° C, dan raadpleegt u best uw arts.

Bij kinderen onder de drie maanden adviseren we u om diezelfde dag uw arts te raadplegen.

Medicatie wordt best gegeven onder de vorm van siroop, de werking hiervan gaat sneller en het kan ook correcter gedoseerd worden. Suppo's kunnen gebruikt worden indien siropen niet kunnen ingenomen worden, bv. bij braken of weigeren.

Er zijn twee verschillende koortswerende middelen:

- Paracetamol (Perdolan® of Dafalgan® siroop of suppo): dit mag vier maal per dag, dus om de zes uur toegediend worden.
- Ibuprofen (Nurofen® siroop of suppo, Malafene® of Perdophen® siroop): dit mag drie maal per dag, dus om de acht uur toegediend worden.

Eerste keuze is **ALTIJD** paracetamol.

Pasgeborenen tot 3 maanden

Bij temperatuur hoger dan 38° C, bij slecht drinken of bij zieke indruk: Neem diezelfde dag contact op met uw arts. Indien nodig zal er een afspraak bij uw arts worden gemaakt.

NOOIT IBUPROFEN GEBRUIKEN OP DEZE LEEFTIJD!

3 maanden tot 1 jaar

Bij temperatuur hoger dan 38,5° C en lastig zijn of bij pijn: U mag Paracetamol in de vorm van siroop geven: optrekken volgens gewicht, maximum vier maal per dag, dus om de zes uur.

Als de koorts onvoldoende zakt of te snel terug stijgt bij het gebruik van Paracetamol: U kunt Ibuprofen toedienen: optrekken volgens gewicht, maximum drie maal per dag, dus om de acht uur.

NOOIT IBUPROFEN GEVEN BIJ WIND- POKKEN!

Wanneer de koorts langer dan drie dagen aanhoudt, onvoldoende zakt of als uw kind algemeen ziek is (blijvend braken, kortademigheid,...): maak een afspraak bij uw arts.

Wanneer uw kind veelvuldig moet braken:

- Laat hem/haar frequent kleine hoeveelheden drinken.
- Los rehydratatievloeistof ORS op in water zoals vermeld op de verpakking. Dien dit gedurende vier uur toe. Als dit niet zou lukken, mag u ook melk geven, steeds in kleine hoeveelheden. Na 4 uur sowieso terug overschakelen op melk.
- U kunt Paracetamol siroop eventueel vervangen door een suppo.

Wanneer uw kind langer dan 12 uur een droge pamber heeft, blijft braken, slap en ziek is: maak een afspraak bij uw arts.